



Inventaire des oiseaux communs

Forêt de Fondjomekwet



DAOUDA SYLLA
Ornithologue, Taxidermiste IRD, Dakar, Sénégal

Cet inventaire a été financé
par l'Observatoire des Patrimoines de Sorbonne Université



**Observatoire
des patrimoines**
SORBONNE UNIVERSITÉS



PALOC

PATRIMOINES LOCAUX, ENVIRONNEMENT
& GLOBALISATION • IRD • MNHN



Inventaire des oiseaux communs

> Forêt de Fondjomekwet

Nom français : **Perroquet Youyou**

Nom latin : ***Poicephalus senegalus* (Boddaert)**

Famille des PSITTACIDÉS

Nom local :

Perroquet bien connu en Europe en tant qu'oiseau de cage. Vivant le plus souvent en groupe, il est et bruyant et se montre cependant assez méfiant. Son fort bec crochu lui permet d'une part de broyer les fruits durs (pain de singe du Baobab, figues...) dont il fait grande consommation et d'autre part de s'agripper aux branches. Il peut parfois s'attaquer aux épis de mil ou de maïs. Il niche dans les cavités des grands arbres. Commun et répandu à Fondjomekwet, le Youyou est cependant menacé en Afrique par la destruction de son habitat (grands arbres) et par les dénichages pour sa commercialisation.



Inventaire des oiseaux communs

> Forêt de Fondjomekwet

Nom français : **Touraco gris**

Nom latin : ***Crinifer piscator (Boddaert)***

Famille des MUSOPHAGIDÉS

Nom local :

Les Touracos que l'on ne trouve qu'en Afrique sont une famille de grands oiseaux voyants, frugivores, de forêt ou de savane. Ils se déplacent agilement parmi les branches en sautant ou en courant. Le Touraco gris est une espèce bruyante, facile à observer à Fondjomekwet, qui affectionne les zones de plantation et de maraichage. Il se nourrit de fruits sauvages ou cultivés comme les goyaves, les figues, les mangues, les fruits du palmier à huile, etc...



Inventaire des oiseaux communs

> Forêt de Fondjomekwet

Nom français : **Milan noir**

Nom latin : ***Milvus migrans* (Boddaert)**

Famille des ALCÉDINIDÉS

Nom local :

La queue échancrée, caractéristique, qu'il peut ouvrir, fermer ou tordre à volonté, lui permet d'effectuer des évolutions aériennes spectaculaires. Il fait une grande consommation de criquets lors des pullulations, mais mange aussi des termites et coléoptères qu'il capture en vol avec ses serres (doigts crochus), des mollusques, crustacés, amphibiens ou petits poissons pris dans l'eau peu profonde, des petits oiseaux ou des lézards sur le sol. A Fondjomekwet, il s'observe plus spécifiquement dans la plaine de Toula et près des villages.



Inventaire des oiseaux communs

> Forêt de Fondjomekwet

Nom français : **Soui-manga à poitrine rouge**

Nom latin : ***Nectarinia senegalensis* (Linné)**

Famille des NECTARINIIDÉS

Nom local :

De couleurs très vives et à reflets métalliques, ces très jolis petits oiseaux sont des butineurs. Leur longue langue mobile leur permet de lécher le nectar des fleurs. Notez le bec effilé et courbe qui permet d'inspecter la corolle des fleurs. Il ne faut pas confondre les Soui-mangas avec les Colibris, exclusivement américains. Le Soui-manga vit dans tous les milieux de Fondjomekwet.



Inventaire des oiseaux communs

> Forêt de Fondjomekwet

Nom français : **Bateleur des savanes**

Nom latin : ***Terathopius ecaudatus***

Famille des ACCIPITRIDÉA

Nom local :

Les bateleurs sont des oiseaux typiques de la savane. Ils capturent toutes sortes de proies, dont de petits mammifères, des serpents, des lézards et quelques invertébrés, mais ce sont essentiellement des prédateurs d'oiseaux. A la saison de reproduction, il exécute des vols de parade spectaculaires, avec de rapides poursuites, des piqués et des retournements latéraux complets. A Fondjomekwet on peut l'observer dans les zones de forêt et dans la plaine de Toula.



Inventaire des oiseaux communs

> Forêt de Fondjomekwet

Nom français : **Vautour palmiste** ou **Palmiste africain**

Nom latin : ***Gypohierax angolensis***

Famille des ACCIPITRIDÉS

Nom local :

C'est une espèce de rapaces, seule représentante du genre *Gypohierax*. Comme tous les vautours, le palmiste se nourrit de cadavres. Son rôle de nettoyeur est important dans la brousse. Il peut aussi manger des œufs d'oiseaux, des termites, des petits mollusques. Tous les vautours qui peuvent planer très haut et très longtemps en utilisant les courants ascendants ont une vue excellente qui leur permet de repérer même à grande distance les cadavres dont ils vont se repaître. A Fondjomekwet on peut l'observer également dans la plaine de Toula.

