



Inventaire des oiseaux communs

Plantations de Fondjomekwet



DAOUDA SYLLA
Ornithologue, Taxidermiste IRD, Dakar, Sénégal

Cet inventaire a été financé
par l'Observatoire des Patrimoines de Sorbonne Université



**Observatoire
des patrimoines**
SORBONNE UNIVERSITÉS

**SORBONNE
UNIVERSITÉ**
CRÉATEURS DE FUTURS
DEPUIS 1257

PALOC

PATRIMOINES LOCAUX, ENVIRONNEMENT
& GLOBALISATION • IRD • MNHN

IRD
Institut de Recherche
pour le Développement
FRANCE



Inventaire des oiseaux communs

> Plantations de Fondjomekwet


Nom français : **Perroquet Youyou**

Nom latin : ***Poicephalus senegalus* (Boddaert)**

Famille des PSITTACIDÉS

Nom local :

Perroquet bien connu en Europe en tant qu'oiseau de cage. Vivant le plus souvent en groupe, il est et bruyant et se montre cependant assez méfiant. Son fort bec crochu lui permet d'une part de broyer les fruits durs (pain de singe du Baobab, figues...) dont il fait grande consommation et d'autre part de s'agripper aux branches. Il peut parfois s'attaquer aux épis de mil ou de maïs. Il niche dans les cavités des grands arbres. Commun et répandu à Fondjomekwet, le Youyou est cependant menacé en Afrique par la destruction de son habitat (grands arbres) et par les dénichages pour sa commercialisation.



Inventaire des oiseaux communs

> Plantations de Fondjomekwet


Nom français : **Touraco gris**

Nom latin : ***Crinifer piscator (Boddaert)***

Famille des MUSOPHAGIDÉS

Nom local :

Les Touracos que l'on ne trouve qu'en Afrique sont une famille de grands oiseaux voyants, frugivores, de forêt ou de savane. Ils se déplacent agilement parmi les branches en sautant ou en courant. Le Touraco gris est une espèce bruyante, facile à observer à Fondjomekwet, qui affectionne les zones de plantation et de maraichage. Il se nourrit de fruits sauvages ou cultivés comme les goyaves, les figes, les mangues, les fruits du palmier à huile, etc...



Inventaire des oiseaux communs

> Plantations de Fondjomekwet

Nom français : **Tourterelle à collier**

Nom latin : ***Streptopelia semitorquata* (Linné)**

Famille des ALCÉDINIDÉS

Nom local :

Très commune et répandue à Fondjomekwet, cette tourterelle est familière et se laisse bien observer. Le cri est un roucoulement caractéristique. Le nid est un amas rudimentaire de quelques branchettes, à la fourche d'une branche. La Tourterelle à collier niche au cours de tous les mois de l'année.



Inventaire des oiseaux communs

> Plantations de Fondjomekwet

Nom français : **Héron garde-bœuf**

Nom latin : ***Ardeola ibis* (Linné)**

Famille des ARDÉIDÉS

Nom local :

Petit héron qui, à distance, paraît tout blanc. Vivant en groupe et familier, on le trouve souvent aux alentours de la piste de Bandja et dans la plaine de Toula. C'est aussi un grand consommateur de criquets et de sauterelles. Cet animal est souvent représenté en photos, dans des parcs nationaux en Afrique, sur des grands ongulés ou sur le dos d'un buffle. Il les débarrasse des tiques et autres parasites qui les tourmentent.



Inventaire des oiseaux communs

> Plantations de Fondjomekwet

Nom français : **Martin-chasseur à tête grise**

Nom latin : ***Halcyon leucocephala* (Linné)**

Famille des ALCÉDINIDÉS

Nom local :

Ressemblant aux Martins-pêcheurs, les Martins-chasseurs consomment insectes, scorpions, mille-pattes et petits vertébrés. Ils plongent sur la proie qu'ils ont repérée à partir d'un poste d'observation et retournent se percher pour tuer et avaler ce qu'ils ont capturé. Ils nichent dans des trous d'arbres. Cet oiseau est fréquent dans la savane. A Fondjomekwet on l'observe dans les champs de plantation et dans les galeries forestières des bas-fonds humides



Inventaire des oiseaux communs

> Plantations de Fondjomekwet

Nom français : **Tisserin gendarme**

Nom latin : ***Ploceus cucullatus* (Müller)**

Famille des PLOCÉIDÉS

Nom local :

Oiseaux vivants en groupe, bruyants, polygames, remarquables par leurs colonies de nids tissés avec des herbes ou des morceaux de feuilles de palmiers. Comme on dit qu'ils portent chance, les habitants des villages où ils se sont installés ne les dénichent pas malgré les dégâts qu'ils peuvent causer aux cultures. La parade nuptiale est spectaculaire, les mâles se suspendant sous le nid par les griffes, la tête en bas et ils battent des ailes pour attirer l'attention des femelles. A Fondjomekwet ils sont très nombreux dans les villages et les bas-fonds humides.



Inventaire des oiseaux communs

> Plantations de Fondjomekwet

Nom français : **Hirondelle à gorge striée**

Nom latin : ***Hirundo abyssinica* (Linné)**

Famille des HIRUNDINIDÉS

Nom local :

Très grosse hirondelle à gorge striée et au vol lourd que l'on peut observer au-dessus de la savane. A distance elle peut même être confondue avec un faucon. Cette hirondelle niche dans les maisons, on l'observe aisément au sein des divers villages de Fondjomekwet. Les hirondelles consomment de nombreux petits insectes (dont les moustiques) qu'elles capturent au vol. On dit que les hirondelles annoncent la pluie quand elles volent plus bas que d'habitude. En fait, lorsque l'humidité de l'air augmente, les ailes des insectes s'alourdissent, ils volent bas et les hirondelles les chassent là où ils se trouvent.



Inventaire des oiseaux communs

> Plantations de Fondjomekwet

Nom français : **Petit Calao à bec rouge**

Nom latin : ***Tockus erythrorhynchus* (Temminck)**

Famille des BUCÉROTIDÉS

Nom local :

Grand consommateur de criquets et sauterelles, cet oiseau au bec démesuré consomme également des fruits, arachides, et bien d'autres choses encore. La femelle construit son nid en milieu de saison des pluies dans la cavité d'un vieil arbre et elle en ferme l'entrée avec de la boue, ne laissant qu'une petite fente par laquelle le mâle lui apportera la nourriture pendant les deux mois que durera la couvaison de ses œufs.



Inventaire des oiseaux communs

> Plantations de Fondjomekwet

Nom français : **Soui-manga à poitrine rouge**

Nom latin : ***Nectarinia senegalensis* (Linné)**

Famille des NECTARINIIDÉS

Nom local :

De couleurs très vives et à reflets métalliques, ces très jolis petits oiseaux sont des butineurs. Leur longue langue mobile leur permet de lécher le nectar des fleurs. Notez le bec effilé et courbe qui permet d'inspecter la corolle des fleurs. Il ne faut pas confondre les Soui-mangas avec les Colibris, exclusivement américains. Le Soui-manga vit dans tous les milieux de Fondjomekwet.



Inventaire des oiseaux communs

> Plantations de Fondjomekwet

Nom français : **Gonolek de Barbarie**

Nom latin : ***Laniarus barbarus* (Linné)**

Famille des LANIIDÉS

Nom local :

Ce très bel oiseau, rouge écarlate dessous, noir de jais dessus et dont le haut de la tête est jaune, n'est pas toujours facile à observer car il a un comportement assez discret. Cependant on peut parfois l'observer dans de bonnes conditions dans un arbre ou un buisson. Son chant en duo est aussi caractéristique. Comme les autres pie-grièches, c'est un oiseau surtout insectivore. A Fondjomekwet on peut l'observer dans les plantations et dans la plaine de Toula.



Inventaire des oiseaux communs

> Plantations de Fondjomekwet

Nom français : **Guêpier à gorge blanche**

Nom latin : ***Merops albicollis* (Müller)**

Famille des MÉROPIDÉS

Nom local :

Ce bel oiseau niche dans des terriers creusés dans les berges de rivières ou de canaux de drainage. En terrain dégagé, mais jamais loin de l'eau, il consomme des insectes volants et principalement des hyménoptères comme les abeilles, les guêpes, les fourmis, et aussi des papillons, des criquets et des libellules, qu'il guette depuis un perchoir. A Fondjomekwet on peut l'observer aux alentours des villages, dans les champs et dans la plaine de Toula.



Inventaire des oiseaux communs

> Plantations de Fondjomekwet

Nom français : **Coucal du Sénégal**

Nom latin : ***Centropus senegalensis* (Linné)**

Famille des CUCULIDÉS

Nom local :

Gros oiseau facile à identifier : longue queue noire, dos roux et ventre blanc. Son vol est lourd et lent, coupé de glissades. Il perche maladroitement. Souvent trouvé à terre où il chasse les sauterelles et des petits vertébrés. Des légendes circulent sur cet oiseau dont les œufs (difficiles à trouver) permettraient (mais à condition de ne pas avoir été touchés avec la main !) de trouver des diamants. A Fondjomekwet on peut l'observer dans les bas-fonds humides, dans les champs, aux alentours des villages et dans la plaine de Toula.



Inventaire des oiseaux communs

> Plantations de Fondjomekwet

Nom français : **Cordon bleu**

Nom latin : ***Uraeginthus bengalus***

Famille des ESTRILDIDÉS

Nom local :

Oiseau peu farouche et qui vit en compagnie d'autres espèces. Très fréquent dans les villages de Fondjomekwet et dans les champs et plantations à la recherche de graine pour la nourriture. Il constitue le plus souvent la proie des serpents.



Inventaire des oiseaux communs

> Plantations de Fondjomekwet

Nom français : **Barbican à poitrine rouge**

Nom latin : *Lybius dubius*

Famille des LYBIIDÉS

Nom local :

Très bel oiseau avec son plumage majestueux. Muni d'un bec conique très puissant, on le rencontre le plus souvent dans les plantations à la recherche de fruits secs. A Fondjomekwet on peut l'observer dans les galeries forestières des bas-fonds humides et dans les plantations.

